4. 9bre 1767

N° 45.

Hydropisie formée dans la Membrane qui recouvre le foye. reconnue à l'ouverture du cadavre d'une fille agée d'environ 16. a 17 ans

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

L'ouverture des cadavres nous instruisent des causes des maladies, dont on n'a pû connoitre auparavant le vrai caractere: j'avoue que celle que je vais rapporter est de ce nombre.

Cette jeune fille avoit fait une chute sur le côté et etoit tombée sur le rebord d'un banc de classe il y a environ trois ans: depuis ce temps elle s'est toujours plaint d'une douleur au côté droit, mais neanmoins asses supportable pour ne pas l'empecher de boire et de manger comme à son ordinaire: mais depuis environ deux ans il se manifesta une tumeur à l'hypocondre gauche sans aucun changement à la peau et qui a augmenté insensiblement et elle est devenue d'un volume très considerable; Dans le premier temps cette tumeur toujours très dure au toucher etoit vacillante elle se portoit de gauche à droit excepté dans le dernier temps, où son volume enorme paroissoit avoir contracté des adherences aux parties circonvoisines: Cette tumeur formoit une grosse saillie au dehors, et elle etoit si dure que je l'ai toujours regardée comme une tumeur skirreuse. La malade a fait usage de differents remedes et tous sans aucun soulagement. Elle avoit considerablemt maigri et sa peau n'a jamais eté œdemateuse: Elle avoit beaucoup de difficulter de respirer et souvent des envies de vomir. Les extremites tant superieures qu'inferieures n'ont jamais eté enflées excepté deux ou trois jours avant sa mort, ses jambes sont devenues œdemateuses, Et il est bon d'observer qu'en touchant son ventre, qu'il ne fait jamais fait, sentir aucun epanchement dans la capacite.

ARC 23 n° 29

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Le volume énorme quávoit aquis cette tumeur, et s'étant toujours manifestée par sa dureté, sous la forme d'une tumeur skirreuse, m'a determiné à demander l'ouverture du Cadavre afin d'en connoitre le vrai caractere... Du 4. octobre 1767.

apres avoir incisé avec menagement les teguments du ventre et de la poctrine; j'ai ouvert avec les mêmes precautions le peritoine et j'ai trouvé environ cinq pintes d'eau de couleur jaune epanchée dans toute la capacité du ventre: Apres avoir ôtté cette quantité d'eau avec un gobelet et une eponge, la tumeur m'a encore paru d'un gros volume située sur l'hypocondre gauche; j'apperçus quatre hydatides sur sa surface exterieure qui se sont crevées en les maniant, En renversant la tumeur d'où il sortit encore beaucoup d'eau, j'apperçus dans sa partie posterieure une crevasse dont les bords étoient legerement ulcerés; C'et par cette crevasse, que s'étoit écoulée l'eau, qui etoit épanchée dans le bas ventre: à coté de celle cy il y avoit une autre tumeur plus grosse qui ne parroissoit point communiquer avec la premiere, Et en voulant la detacher des adherences qu'elle avoit contractée aux parties voisines, Elle se perça, il en sortit environ trois pintes d'eau tres claire, Et lorsque l'eau fut écoulée, il sortit de ces deux kistes, une forme de membrane tres étendue presque cartilagineuse et tres blanche, qui tapissoit tout l'interieur de ces deux sacqs: Ces portions membraneuses ont positivement la figure d'un bonnet de nuit dont les deux surfaces sont tres unies et polies.

Les cotes tant vrais que fausses etoient si rapprochées et poussées l'une contre l'autre

vers la partie Superieure de lapoitrine,
quelles paroissoient Se toucher les unes et les
autres. Le Sternum etoit fort court, Et les
poumons Se trouvoit foules vers lehaut de
la poitrine et ils etoient Si petits quils
n'exèdoit pas levolume dune moiene poire.
L'epiploon etoit presque entierement fondu.
Les intestins n'ont offert rien departiculier
que par leur volume fort diminue. Les
glandes du mesantere etoient pour la plus
part obstruees. La ratte etoit noiratre et dun
petit volume et les reins apeu pres dememe.

Cette Maladie peut etre remarquable
dans son genre, puisquelle caracterise une
hydropisie enKistée dont le Siege Sest formé
entre les feuillets qui composent la membrane
externe du foye comme on peut le remarquer
par la piece que jai lhonneur depresenter
à lacademie. On voit que les Kistes tienent
et sont continues à lamembrane qui recouvre
le foye: Cette tunique comme on Sait est une
continuation du peritoine et contient un
grand nombre de vaisseaux limphatiques
repandus entre les feuillets membraneux
qui composent cette membrane: Il Semble,
quon est fondé de croire que la chute quavoit
fait cette jeune fille Sur le Côte, à derange
les fonctions des vaisseaux limphatiques et
à donné occasion à laisser echaper la Serosité
qui Sest accumulee peu à peu entre les
feuillets de cette membrane et que cette quantité
deau à transude par lextremite des vaisseaux
limphatiques et cet epanchée entre les feuillets
membraneux de cette tunique.

Delaporte

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE